

Predicciones de las condiciones de propagación HF **ALONSO MOSTAZO PLANO, EA3EPH.**

Condiciones generales de propagación HF para octubre noviembre 2016.

El día 1 de octubre a las 12 UTC el Sol se encuentra a $-3^{\circ} 19'$ latitud Sur, alcanzando una elevación de 46° al mediodía sobre Madrid.

Según las previsiones del SWPC de la "NOAA" el flujo solar medio de 2800MHz estimado para éste mes al realizar los cálculos es 88.9, como otras veces, se darán días con valores diferentes e independientemente de las características de cada circuito, se estiman las siguientes condiciones de propagación HF dentro de un comportamiento global de la ionosfera y al margen de las variaciones no periódicas de ésta:

A/-POR SITUACIÓN GEOGRÁFICA.

1/-HEMISFERIO NORTE:

1.1-Norte de Sudamérica y zona ecuatorial:

Al amanecer y hacia la zona en que es de día, la Máxima Frecuencia Utilizable será cercana a los 14 MHz, creciente e “inferior” hacia la zona en que es de noche. Poco después la MFU superará los 17 MHz, alcanzará alrededor de los 22 MHz en horas cercanas al mediodía y “poco más” a lo largo la tarde.

Principalmente en horas cercanas al ocaso serán operables frecuencias levemente superiores hacia la zona en que es de día, descenderán despacio a lo largo de la noche y la MFU se situará cerca de los 13 MHz en horas cercanas a la media noche e inferior pasada ésta.

2/- HEMISFERIO SUR:

2.1-Latitudes Medias:

En latitudes medias del hemisferio Sur, al amanecer la Máxima Frecuencia Utilizable oscilará entre los 10 MHz y 12 MHz, ascendente hacia la zona en que es de día y alcanzará la alrededor de los 22 MHz en horas cercanas al mediodía.

Durante la mañana esas condiciones serán regulares entre los 14 MHz y 18 MHz, con pérdida por encima de los 18 MHz, aunque podrían ser “esporádicamente” operables frecuencias más altas e igualmente con pérdida al trabajar en frecuencias inferiores a los 18 MHz “salvo para distancias cortas”.

Durante la tarde y hasta poco antes del anochecer esas condiciones se mantendrán regulares hacia la zona en que es de día “principalmente” entre los 17 MHz y 22 MHz y como en la mañana, “esporádicamente” podrían ser operables frecuencias levemente superiores, así como inferiores a los 18 MHz “pasada la media tarde” y mayormente al acercarnos al al ocaso.

Al anochecer la MFU descenderá hasta alrededor de los 10 MHz en horas cercanas a la medianoche, manteniéndose en la noche buenas condiciones entre los 7 MHz y 10 MHz, con pérdida conforme la frecuencia de trabajo es menor y hasta alrededor de los 3 MHz.

2-2- Latitudes Altas:

En latitudes superiores **al amanecer la MFU será cercana a los 9 MHz**, se mantendrán unas condiciones **regulares entre los 10 MHz y 16 MHz durante el día y difícilmente en frecuencias superiores**, alcanzando la **Máxima Frecuencia Utilizable “justamente” los 18 MHz en horas cercanas al mediodía**, condiciones que posiblemente persistan hasta poco antes del anochecer.

Al anochecer la MFU descenderá rápidamente e incluso por debajo de los 7 MHz pasada la medianoche.

B/-POR BANDAS "Ambos hemisferios".

Banda de 10 11 y 13m

Ambos Hemisferios: Durante el día, las condiciones de propagación serán malas, aunque “principalmente” en el hemisferio Sur podrían estar ayudadas por la presencia de ionizaciones esporádicas.

Durante la noche cerrada.

Bandas de 15 y 16m

En ambos hemisferios: Durante el día, las condiciones serán regulares con tendencia a malas, cierres esporádicos esporádicos a cualquier hora y condiciones para el DX más probables en el hemisferio Sur, “principalmente” en horas cercanas al ocaso y hacia la zona en que es de día.

Durante la noche cerrada, salvo poco después del anochecer.

Bandas de 19 y 20m

Hemisferio Norte: Durante el día las condiciones de propagación serán regulares, con empeoramiento en horas cercanas al mediodía e incluso algún cierre esporádico, manteniéndose distancias de salto comprendidas entre los 1100 Km y 2100 Km. Poco antes del anochecer mejorarán las condiciones y se extenderán para el DX hasta poco después de éste, manteniéndose hasta poco después unas condiciones regulares, aunque en latitudes altas, así como avanzada la noche, es posible que cierren estas bandas.

Hemisferio Sur: Durante el día las condiciones serán regulares, máximas para del DX en horas cercanas al orto/ ocaso y "esporádicamente" con cierres a lo largo de la noche, menormente en latitudes bajas.

En ambos hemisferios: Propagación entre ambos hemisferios, mayormente en horas cercanas al ocaso.

Banda de 25m

Hemisferio Norte: Durante el día esas condiciones serán regulares, con empeoramiento en horas cercanas al mediodía y cierres esporádicos, manteniéndose distancias de salto comprendidas entre los 500 km y 1200 km durante el día y máximas en horas cercanas al orto/ocaso.

En la noche serán buenas en general.

Hemisferio Sur: Durante el día las condiciones serán levemente peores que las dadas

en el hemisferio norte.

Al anochecer mejorarán, alcanzándose las máximas para el DX alrededor de la media noche.

Banda de 31m

Hemisferio Norte: Durante el día las condiciones serán regulares y con empeoramiento alrededor del mediodía.

Poco antes del anochecer mejorarán, serán con tendencia a buenas en la noche, máximas para el DX desde poco después de anochecer y hasta horas cercanas a la medianoche.

Hemisferio Sur: Durante el día las condiciones serán levemente peores que las dadas en el hemisferio Norte, con distancias de salto comprendidas entre los 500 Km y 1300 Km aproximadamente.

Desde poco antes del anochecer y hasta alrededor de la medianoche las condiciones serán regulares y después de ésta puede darse algún empeoramiento, aunque es posible recuperen más tarde.

Las máximas condiciones para el DX en horas cercanas al orto y ocaso.

Banda de 40m

Hemisferio Norte: Durante el día se darán unas condiciones regulares, con distancias de salto comprendidas entre los 500 Km y 1000 Km, “crecientes” conforme la elevación del Sol es menor y posiblemente inferiores a los 500 Km alrededor del mediodía.

Poco antes del anochecer mejorarán, serán regulares con tendencia a buenas en la noche y máximas para el DX en horas cercanas al orto y ocaso.

Hemisferio Sur: Durante el día las condiciones serán regulares, con tendencia a malas alrededor del mediodía y distancias de salto entre los 400 Km y 1200 Km durante el día, crecientes según la elevación del Sol es menor.

Durante toda la noche las condiciones serán regulares con tendencia a buenas, máximas alrededor de la medianoche y empeorando fuertemente al amanecer.

Banda de 49m

Hemisferio Norte: Durante el día las condiciones serán regulares y con empeoramiento alrededor del medio día.

Poco después del anochecer mejorarán, serán máximas e incluso para el DX alrededor de la medianoche, así como después de ésta.

Hemisferio Sur: Durante el día condiciones parecidas a las dadas en el hemisferio norte y durante la noche levemente peores, máximas alrededor de la medianoche, manteniéndose regulares durante toda la noche.

Banda de 80 y 160m

Ambos Hemisferios: Debido a una fuerte absorción, difícilmente se darán comunicados en éstas bandas durante el día, salvo en horas cercanas al orto/ocaso. Poco después del anochecer, las condiciones mejorarán conforme avanza la noche, máximas alrededor de la media noche, así como poco después de ésta.

En todas las bandas:

Salto inferiores a los mínimos mencionados por presencia de esporádicas y mayores distancias a los máximos por saltos múltiples.

CONCEPTOS:

1/-MAXIMA FRECUENCIA UTILIZABLE "MFU":

La máxima frecuencia utilizable "MFU" es básicamente la frecuencia más alta que permite la comunicación entre dos puntos mediante refracción ionosférica, el valor de ésta y al margen de los sistemas empleados depende principalmente del nivel de densidad electrónica y en consecuencia del valor de la frecuencia crítica dado en la ionosfera así como del ángulo de radiación de la onda o bien del ángulo de incidencia al alcanzar la ionosfera.

2/-FRECUENCIA OPTIMA DE TRABAJO "FOT":

La frecuencia óptima de trabajo "FOT", se considera que es la frecuencia más estable y segura que permite la comunicación entre dos puntos por refracción ionosférica. El valor de ésta es un 85% de la máxima frecuencia utilizable, dependiendo principalmente de la elevación del Sol, actividad Solar y actividad magnética, sin tener en cuenta las condiciones de emisión y recepción.

Estudio de circuitos HF desde Sudamérica otras zonas.

Periodo de aplicación: Octubre-Noviembre 2016

(Programa Sondeo de EA3EPH)

Flujo Solar estimado según SWPC/NOAA: 88.9

FOT y MFU expresadas en MHz

América del Norte (costa Este)

UTC	FOT	MFU
00	11.9	14.0
02	9.8	11.6
04	7.8	9.4
06	8.3	9.8
08	10.5	12.4
10	13.0	14.8
12	15.8	18.6
14	16.8	19.8
16	18.1	21.3
18	17.1	20.1
20	15.1	17.8
22	15.5	18.2

América del Norte (costa Oeste)

UTC	FOT	MFU
00	13.0	15.3
02	10.6	12.5

04	10.1	11.9
06	9.2	10.8
08	7.8	9.2
10	9.6	11.3
12	12.2	14.3
14	12.1	14.2
16	19.1	22.5
18	17.3	20.4
20	15.2	17.9
22	16.5	18.2

Centroamérica y Caribe

UTC FOT MFU

00	13.9	15.2
02	10.6	12.5
04	7.3	8.6
06	7.2	8.5
08	8.1	9.8
10	9.5	11.2
12	10.0	11.8
14	17.7	20.8
16	16.9	19.9
18	16.9	19.9
20	15.3	18.0
22	15.6	18.3

Asia central y oriental, Japón

UTC FOT MFU

00	13.3	15.6
02	10.6	12.5
04	10.0	11.8
06	11.2	13.2
08	12.6	14.8
10	12.2	14.3
12	9.9	11.7
14	8.2	9.6
16	9.6	11.3
18	11.1	13.1
20	12.8	15.1
22	15.5	18.2

Australia, Nueva Zelanda

UTC FOT MFU

00	13.0	15.3
02	10.6	12.5

04	9.9	11.7
06	11.0	13.0
08	12.5	14.7
10	12.8	15.0
12	10.5	12.4
14	9.9	11.6
16	10.9	12.8
18	12.6	14.8
20	11.7	13.8
22	15.5	18.2

África central y Sudáfrica

UTC	FOT	MFU
00	11.1	13.1
02	10.6	12.5
04	10.5	12.3
06	11.1	13.1
08	12.6	14.8
10	12.0	14.1
12	14.2	16.7
14	15.7	18.5
16	12.8	15.0
18	13.1	15.4
20	11.1	13.1
22	10.0	11.8

Europa

UTC	FOT	MFU
00	7.9	9.3
02	8.7	10.2
04	9.9	11.7
06	11.2	13.2
08	12.9	15.2
10	12.1	14.2
12	16.3	19.2
14	16.8	19.8
16	17.8	21.0
18	14.8	17.5
20	11.5	13.5
22	9.2	10.8

Oriente Medio

UTC	FOT	MFU
00	10.5	12.3
02	10.8	12.7

04	10.2	12.0
06	11.3	13.3
08	12.8	15.1
10	12.1	14.3
12	16.3	19.2
14	16.8	19.8
16	12.8	15.1
18	11.6	13.6
20	9.1	10.7
22	8.2	9.7

73s y buenos DX
alonso, ea3eph.