

Predicciones de las condiciones de propagación HF ALONSO MOSTAZO PLANO. EA3EPH.

Condiciones generales de propagación HF para mayo junio 2011.

Como otros años, el día 1 de mayo el Sol se encuentra a 15° 12' latitud norte, alcanzando una elevación de 64.5° al mediodía sobre Madrid. Durante el día. están presentes las zonas F1 y F2 el hemisferio norte, así como la zona F en el hemisferio Sur, persistiendo ésta durante la noche y en ambos hemisferios.

El Flujo solar en 2800 MHz previsto para este mes por la "NOAA" es 108.2, como otras veces, se darán valores superiores al flujo solar medio previsto, e independientemente de las condiciones particulares de cada circuito, pueden darse frecuencias superiores a la MFU calculada, con una variación máxima de alrededor de 2 MHz estimando las siguientes condiciones de propagación HF, al margen de las variaciones no periódicas de la ionosfera:

Bandas de 10, 11 y 13

Ambos Hemisferios: Aunque difícilmente, podrán darse aperturas alrededor del mediodía y posteriores, más probable en el hemisferio norte, así como en latitudes bajas de ambos hemisferios, además ayudadas por la presencia de ionizaciones esporádicas, aunque en general las condiciones de propagación serán malas.

Bandas de 15 y 16m

En ambos hemisferios: Las condiciones en estas bandas durante el día serán regulares, empeorando conforme es mayor la latitud mayormente en el hemisferio sur.

Podrán darse aperturas a lo largo del día, en ambos hemisferios y sin necesidad de la presencia de ionizaciones esporádicas, las cuáles acortarán la distancia de salto en frecuencias inferiores e igualmente se darán largos cierres esporádicos a lo largo del día, con máximas condiciones para el DX, durante el día y en horas cercanas al orto y ocaso hacia la zona iluminada por el Sol.

Bandas de 19 y 20m

Hemisferio Norte: Las condiciones de propagación serán regulares con tendencia a buenas y con leve mejoría con respecto al anterior mes, máximas condiciones de DX en horas cercanas al orto y al ocaso, manteniéndose a lo largo del día y extendiéndose hasta después del anochecer.

Durante el día se darán saltos medios y largos comprendidos entre los 1400 Km y 2800 Km.

Hemisferio Sur: Las condiciones serán durante todo el día parecidas a las dadas en el hemisferio norte, aunque con leve empeoramiento. Máximas para del DX en horas cercanas al orto y al ocaso, posibles cierres en horas cercanas al mediodía y cerrando ambas bandas poco después del anochecer.

En ambos hemisferios: Propagación entre ambos hemisferios, mayormente en horas cercanas al ocaso.

Banda de 25m

Hemisferio Norte: Durante el día, las condiciones de propagación serán buenas, aunque con empeoramiento en horas cercanas al mediodía, máximas condiciones para el DX desde poco antes del amanecer y hasta poco después del anochecer, manteniéndose durante todo el día saltos comprendidos entre los 700 km y 2400 km aproximadamente.

Hemisferio Sur: Durante el día las condiciones parecidas a las dadas en el hemisferio norte, máximas condiciones para el DX poco antes del amanecer hasta poco después del anochecer, manteniéndose durante todo el día saltos comprendidos entre los 800 Km y 2500 Km aproximadamente.

Banda de 31m

Hemisferio Norte: Durante el día las condiciones de propagación regulares, con empeoramiento en horas cercanas al mediodía y manteniéndose en general saltos comprendidos entre los 500 Km y 1100 Km durante todo el día.

Al entrar la noche las condiciones mejorarán, alcanzándose las máximas e incluso para el para el DX en horas cercanas a la medianoche.

Hemisferio Sur: Durante el día las condiciones de propagación serán muy parecidas a las dadas en el hemisferio norte, mejorando las condiciones poco antes del anochecer y alcanzándose las máximas para el DX en horas cercanas a la medianoche.

Banda de 40m

Hemisferio Norte:

Durante el día las condiciones en general serán regulares, con empeoramiento alrededor del mediodía, manteniéndose todo el día saltos comprendidos entre 400 Km y 1100 Km.

Poco antes del anochecer las condiciones mejorarán, dándose buenas condiciones en general, e igualmente para el DX, durante toda la noche y manteniéndose saltos comprendidos entre los 1300 Km y 3000 Km a lo largo de ésta.

Hemisferio Sur:

A lo largo del día, se darán unas condiciones de propagación regulares, con empeoramiento en horas cercanas al mediodía.

La distancia de salto será variable, alrededor de los 500 Km en horas cercanas al mediodía y hasta los 1100 Km aproximadamente en horas cercanas al ocaso.

Poco antes del anochecer, mejorarán las condiciones, dándose buenas condiciones en general durante toda la noche y alcanzándose las máximas para el DX alrededor de la media noche.

Banda de 49m

Hemisferio Norte: Durante el día las condiciones de propagación malas, con difíciles aperturas y saltos comprendidos entre los 300 km y 500 km aproximadamente en caso de éstas.

Al entrar la noche, las condiciones mejorarán, alcanzándose las máximas condiciones así como para el DX alrededor de la medianoche y poco después de ésta, manteniéndose en general y durante toda la noche, saltos comprendidos entre los 1100 km y 2800 km.

Hemisferio Sur: A lo largo del día las condiciones de propagación serán muy parecidas a las dadas en el hemisferio norte, durante la noche mejores condiciones, alcanzándose las máximas en horas cercanas a la medianoche, manteniéndose durante toda la noche saltos de hasta 3000 km, con empeoramiento al acercarnos al amanecer.

Bandas de 80 y 160m

Ambos hemisferios: Durante el día, a una fuerte absorción que será más pronunciada en los 160m, imperará comunicados en éstas bandas, difícilmente se darán aperturas en estas bandas, excepto con una baja elevación del Sol.

Poco antes del anochecer, mejorarán las condiciones, comenzando a abrir primeramente los 80m y más tarde los 160m, con saltos que irán incrementando su distancia conforme avanza la noche, hasta alrededor de los 3000 Km en horas cercanas a la medianoche, alcanzándose en horas cercanas las máximas condiciones para el DX .

Estudio de circuitos HF desde Canarias a otras zonas

Periodo de aplicación: Mayo-Junio 2011 (Programa de Sondeo de EA3EPH)

Flujo solar estimado (según NOAA): 108.2 FOT y MFU expresado en MHz

Atlántico Norte

UTC	FOT	MFU
00	8.7	10.2
02	8.6	10.1
04	8.2	9.7
06	9.1	10.7
08	10.2	12.0
10	15.7	18.5
12	18.0	21.2
14	19.0	22.3
16	20.0	23.5
18	17.7	20.9
20	13.6	16.0
22	10.0	11.0

Atlántico Central

UTC	FOT	MFU
00	8.8	10.3
02	8.6	10.1
04	6.0	7.1
06	6.7	7.9
08	7.9	9.4
10	11.5	13.5
12	12.6	19.7
14	17.8	21.0
16	20.0	23.5
18	17.7	20.9
20	13.6	16.0
22	10.0	11.0

Atlántico Sur

UTC	FOT	MFU
00	7.2	8.5
02	6.0	7.1
04	6.0	7.1
06	7.2	8.5
08	10.9	12.8
10	16.0	19.9
12	19.4	22.8
14	20.0	23.6
16	20.0	23.6
18	17.7	20.9
20	13.6	16.0
22	10.0	11.5

Indico

UTC	FOT	MFU
00	8.7	10.2
02	8.6	10.1
04	9.6	11.4
06	11.3	13.3
08	16.9	19.9
10	16.8	19.2
12	14.0	16.2
14	10.5	12.4
16	8.3	9.8
18	6.0	7.1
20	6.0	7.1
22	7.1	8.4

Pacífico NE

UTC	FOT	MFU
00	10.0	11.5
02	8.5	10.3
04	8.2	9.7
06	8.1	9.5
08	8.2	9.7

10	8.2	9.7
12	8.8	10.3
14	9.8	11.6
16	13.4	15.8
18	17.3	20.4
20	14.7	17.3
22	10.3	12.2

Pacific NO

00	8.9	10.5
02	8.1	9.5
04	8.1	9.5
06	10.2	12.0
08	12.7	14.9
10	15.6	18.3
12	10.6	12.4
14	8.7	10.2
16	8.1	9.5
18	8.4	9.7
20	8.9	10.5
22	10.3	12.2

Pacific Central/Sur

UTC	FOT	MFU
00	8.8	10.3
02	8.6	10.1
04	6.0	7.1
06	6.0	7.1
08	6.0	7.1
10	7.2	8.5
12	10.9	12.8
14	13.3	15.6
16	19.4	22.8
18	17.7	20.9
20	13.6	16.0
22	10.0	11.0

Mediterráneo

UTC	FOT	MFU
00	8.1	9.5
02	8.6	10.1
04	8.6	10.1
06	10.3	12.2
08	16.9	19.9
10	19.9	23.4
12	20.5	24.1
14	18.1	21.3
16	13.5	15.9
18	10.3	12.2
20	9.4	10.9
22	8.1	9.5

Saludos.

Alonso, EA3EPH